

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Даудельная ул., д.1, Тюмень, 625002 тел./факс: (3452) 25-17-18, 24-34-31 e-mail: tocomid@mail.ru  
ОКПО 21757948 ОГРН 1027200803640 ИНН/КПП 7202070194/720201001

**Отделение анестезиологии и реанимации**

Руководителю отдела РНЦРХТ  
директору ООО «Биосурф»  
проф. РОЗЕНБЕРГУ О.А.

Уважаемый Олег Александрович!

«Сурфактант БЛ» был использован в нашем отделении для лечения острого легочного повреждения при пневмониях, развившихся как осложнение гриппа АН1N1 у четырех женщин. Три из них были родоразрешены. Введение «Сурфактанта БЛ» осуществлялось эндобронхиально в дозе 75мг в каждый бронх через 12 часов в течение 2-3 дней в сочетании с ПДКВ 13-14 см.вод.ст. У одной беременной в сроке 34 недели беременности введение препарата проводилось ингаляционно.

Во всех случаях отмечалась четкая положительная динамика уже после первых суток введения: повышался индекс оксигенации, улучшалась аускультативная и рентгенологическая картина в легких. Побочных эффектов и осложнений при введении препарата не было.

Кроме того, есть случай успешного ингаляционного применения «Сурфактанта БЛ» у 90-летней женщины с пневмонией, на фоне высокопатогенного гриппа.

При вирусных пневмониях, по данным некоторых авторов, происходит прямое повреждающее воздействие вируса на альвеолоциты 2-го порядка с разрушением эндогенного сурфактанта. Этим можно объяснить высокую эффективность сурфактант-терапии при осложненном течении гриппа АН1N1.

Мы имеем опыт использования «Сурфактанта БЛ» с 2005г, что позволило значительно сократить продолжительность ИВЛ и, соответственно, сроки пребывания больных в АРО. Около 25-ти больным с ОРДС в составе многокомпонентной интенсивной терапии вводился данный препарат.

Считаем, что применение «Сурфактанта БЛ» у акушерских больных с синдромом острого легочного повреждения, на фоне: массивных гемотрансфузий, сепсиса, аспирационного пневмонита, пневмонии и др., обладает высокой эффективностью и позволяет существенно снизить показатели материнской смертности.

Зам.главного врача ГЛПУ ТО  
«Перинатальный центр»,  
главный акушер-гинеколог ТО



Кукарская И.И.

Зав.АРО



Швечкова М.В.